

УДК 598.2.063.5:811.161.2'373.22:598.276.2

Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 1

Г. В. Фесенко

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (Київ, Україна)

Names of Genera in the Ukrainian Nomenclature of Birds of the World. Non-Passeriformes. Part 1. — Fesenko, H. V. — The necessity to form the composition of the national names of birds' genera of the world fauna as a basis for creating the principle of typification of the national nomenclature of over genus level taxa is justified. Four kinds of genus names are now standard in home nomenclature of the birds. All they are presented in proposed list of national genus names. Less than 200 genera of non-home fauna are named in Ukrainian in previous scientific works. That is a few part of world bird classifications. In this article the proposed list includes 460 genera where nearly two-thirds are named in Ukrainian for the first time. The genera composition is the same that is in the classification presented in publication "Handbook of the Birds of the World". The list covers only part of Non-Passeriformes orders, namely Struthioniformes, Tinamiformes, Sphenisciformes, Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Opisthocomiformes, Gruiformes, Charadriiformes. As national definitions of genera a number of neologisms are proposed and borrowings from several foreign languages are derived. In an indirect way the national names for more than 170 species of birds that have not yet been named in national scientific sources are represented.

Key words: *Ukrainian nomenclature of birds, names of genera, avifauna of the World.*

Address: I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of NAS of Ukraine, Bohdan Khmelnytskyi St. 15, Kyiv, 01601 Ukraine; e-mail: h.fesenko@gmail.com

Вступ

Недостатня розробленість власного наукового термінологічно-номенклатурного апарату в будь-якій живій мові може значною мірою гальмувати якщо не самі дослідження, то принаймні поширення набутих знань у тій чи іншій національній спільноті. Зокрема, латинські назви тварин і рослин у пояснювальних текстах музейних експозицій та виставок, що наведені без простої транслітерації чи транскрипції, або навіть озвучування цих назв під час навчальних лекцій можуть викликати відчуття незвичності, яке у одних стимулює інтерес дізнатися більше про об'єкт із незрозумілою назвою і спробу запам'ятати її, але частіше створює перепону у сприйнятті інформації та врешті спричиняє байдужість у пересічного слухача або відвідувача.

Створення розлогої системи національних назв біологічних видів та одиниць інших класифікаційних рангів, що представлені як у вітчизняній, так і загальносвітовій фауні та флорі, є потребою викладання природничих дисциплін у вищих навчальних закладах. Необхідність у такому називництві демонструють, наприклад, останні публікації з зоогеографії [13, 21, 22]. З інших галузей суспільної діяльності, в яких проявляється зацікавленість у розвинутій національній природничій номенклатурі, слід назвати ведення бібліотечної справи, законотворчу сферу, видавничий напрямок тощо.

Стан проблеми і методичні підходи

Після доволі тривалого початкового етапу формування складу вітчизняного називництва птахів для наукового використання, коли ще не було обрано певні засади його укладання, настав період визнання і застосування тих самих головних принципів, що прийняті для системи сучасної латинської номенклатури у такому документі, як «Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури» [12]. Один з двох головних принципів цього кодексу — типіфікація назв усіх

таксонів надродового рівня за назвою типового роду, а саме формування на її основі однослівних назв вищих рангів, і включення її у двослівну назву виду та повну, трислівну назву підвиду. Тож базовою у латинській природничій номенклатурі є назва роду [6, 16, 25]. Обрання назв для цього таксономічного рівня створює підґрунтя і національного називництва.

У першому спеціалізованому словнику, що містить пропоновану для наукового вжитку номенклатуру птахів, бачимо лише трохи більше десяти назв родів [23], з яких однакова кількість стосується вітчизняної та іноземної фауни.

За чверть століття з друку вийшов камеральний визначник птахів вітчизняної фауни, де вперше подано національні назви 172 родів, які тоді виділяли в класифікаційних системах і були представлені в довідці країни [4]. Згаданий визначник став широко використовуваним у наукових колах. Пізніше серед натуралістів-аматорів найбільшої популярності набув добре ілюстрований перший вітчизняний польовий визначник [10]. Склад видів і родів у ньому дещо збільшився порівняно з камеральним визначником, та національні назви родів наведені в цілому ті самі.

На рік раніше від польового визначника з'явився зоологічний словник О. П. Маркевича та К. І. Татарка [11]. У ньому перелік родів птахів значно ширший, ніж у складі вітчизняної фауни, бо серед них майже 190 родів виключно іноземного поширення. Усі вони означені українськими назвами. Кількість видів птахів у цьому словнику складає менше десятої частини від загального видового складу орнітофауни світу. Перелік родів також доволі обмежений.

Результати розробки

З метою створення важливої ланки для формування розгалуженої вітчизняної номенклатури птахів світу, взявши за основу класифікаційну систему, прийняту у шістнадцятитомному виданні "Handbook of the Birds of the World", пропонуємо національні означення родів птахів (табл. 1). Наразі представлено першу частину складу назв родів негоробиних птахів, які містять перші три томи вказаного англomовного видання [26, 27, 28].

Матеріал таблиці охоплює 15 рядів: Struthioniformes, Tinamiformes, Sphenisciformes, Gaviformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Opisthocomiformes, Gruiformes, Charadriiformes. Послідовність рядів, родин і підродин така сама, як у обраній класифікаційній системі, перелік родів у межах підродин або родин укладений за латинською абеткою. Таблиця містить назви 460 родів, з яких приблизно для двох третин національні означення запропоновано вперше. До переліку включено кілька родів, види яких вже вимерли і які згадані у першому вітчизняному посібнику з зоогеографії [9].

У таблиці використано такі скорочення та позначення:

- 1) *лат.* — латинська, *пол.* — польська, *рос.* — російська, *укр.* — українська, *франц.* — французька мови;
- 2) до родів, українська назва яких містить іменник з назви типового роду в межах родини або підродини, вжито визначення «*споріднений*», тоді як будь-який з решти родів (між собою таксономічно найближчих), в українських назвах яких використано іменник, відмінний від назви типового роду, позначено як «*близькоспоріднений*».

Якщо за нормою латинської наукової номенклатури назва роду має бути виключно в однині й однослівною у формі іменника [12], то у вітчизняній номенклатурі птахів закріпилися різноманітніші форми назв, хоча всі вони використовуються також тільки в однині.

Вітчизняні назви родів птахів усталилися у двох формах: у вигляді виключно іменника та у поєднанні прикметника з іменником [16]. Суто іменникова форма представлена двома графічними варіантами, тоді як інша включає також два варіанти, але вони відмінні не за написанням, а за функцією — змістовим навантаженням.

Таблиця 1. Родові назви для вітчизняної номенклатури негоробиних птахів світу

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
1	Struthioniformes Latham, 1790		
2	Struthionidae Vigors, 1825		
3	Struthio Linnaeus, 1758	Страус	[11]
4	Rheidae Bonaparte, 1849		
5	Pterocnemia G.R. Gray, 1871	Малий нанду	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rhea</i> (див. № 6 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Pterocnemia pennata</i>
6	Rhea Brisson, 1760	Нанду	[11]
7	Casuariidae Kaup, 1847		
8	Casuaris Brisson, 1760	Казуар	[11]
9	Dromaiidae Huxley, 1868		
10	Dromaius Vieillot, 1816	Ему	[11]
11	Apterygidae G.R. Gray, 1840		
12	Apteryx Shaw, 1813	Ківі	[11]
13	Dinornithidae Bonaparte, 1853		
14	Dinornis Owen, 1843	Моа	[9]
15	Euryapteryx Haast, 1874	Широкодзьобий моа	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Dinornis</i> (див. № 14 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Euryapteryx gravis</i>
16	Megalapteryx Haast, 1885	Південний моа	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Dinornis</i> (див. № 14 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Megalapteryx didinus</i>
17	Aepyornithidae Bonaparte, 1853		
18	Aepyornis I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1851	Епіорніс	Транскрипція з лат. назви роду, вжита О. Б. Кістяківським та О. П. Корнєєвим [9]
19	Tinamiformes Huxley, 1872		
20	Tinamidae G.R. Gray, 1840		
21	Tinaminae G.R. Gray, 1840		
22	Crypturellus Braboume et Chubb, 1914	Татаупа	Введено у цій праці; як укр. назву роду вжито транслітерацію з видового означення у лат. назві виду <i>Crypturellus tataupa</i>
23	Nothocercus Bonaparte, 1856	Бурий тинаму	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Tinamus</i> (див. № 24 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Nothocercus bonapartei</i>
24	Tinamus Hermann, 1783	Тинаму	[11]
25	Rhynchotinae von Boetticher, 1934		
26	Eudromia I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832	Чубатий інамбу	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rhynchotus</i> (див. № 29 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Eudromia elegans</i>
27	Nothoprocta P.L. Sclater et Salvin, 1873	Гірський інамбу	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rhynchotus</i> (див. № 29 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за біотопом перебування усіх видів роду
28	Nothura Wagler, 1827	Нотура	[17]
29	Rhynchotus Spix, 1825	Інамбу	Введено у цій праці; запозичено з німецької — «inambu», за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флінта [1]
30	Taoniscus Gloger, 1842	Карликовий інамбу	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rhynchotus</i> (див. № 29 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Taoniscus nanus</i>
31	Tinamotis Vigors, 1837	Трипаллий інамбу	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rhynchotus</i> (див. № 29 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
32	Sphenisciformes Sharpe, 1891		
33	Spheniscidae Bonaparte, 1831		
34	Aptenodytes J.F. Miller, 1778	Королівський пінгвін	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Spheniscus</i> (див. № 39 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Aptenodytes patagonicus</i>
35	Eudyptes Vieillot, 1816	Червонодзьобий пінгвін	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Spheniscus</i> (див. № 39 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
36	Eudyptula Bonaparte, 1856	Малий пінгвін	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Spheniscus</i> (див. № 39 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Eudyptula minor</i>

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
37	<i>Megadyptes</i> Milne-Edwards, 1880	Жовтоокий пінгвін	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Spheniscus</i> (див. № 39 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Megadyptes antipodes</i>
38	<i>Pygoscelis</i> Wagler, 1832	Антарктичний пінгвін	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Spheniscus</i> (див. № 39 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Pygoscelis antarctica</i>
39	<i>Spheniscus</i> Brisson, 1760	Пінгвін	[11]
40	Gaviiformes Wetmore et Miller, 1926		
41	Gaviidae J.A. Allen, 1897		
42	<i>Gavia</i> J.R. Forster, 1788	Гаґапа	[4]
43	Podicipediformes Fürbringer, 1888		
44	Podicipedidae Bonaparte, 1831		
45	<i>Aechmophorus</i> Coues, 1862	Неоарктична пірникоза	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Podiceps</i> (див. № 46 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
46	<i>Podiceps</i> Latham, 1787	Пірникоза	[20]
47	<i>Podilymbus</i> Lesson, 1831	Рябодзьоба пірникоза	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Podiceps</i> (див. № 46 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Podilymbus podiceps</i>
48	<i>Poliocephalus</i> Selby, 1840	Сивоголова пірникоза	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Podiceps</i> (див. № 46 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Poliocephalus poliocephalus</i>
49	<i>Rollandia</i> , Bonaparte, 1856	Короткокрила пірникоза	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Podiceps</i> (див. № 46 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Rollandia microptera</i>
50	<i>Tachybaptus</i> Reichenbach, 1853	Мала пірникоза	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Podiceps</i> (див. № 46 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Tachybaptus ruficollis</i>
51	Procellariiformes Fürbringer, 1888		
52	Diomedidae G.R. Gray, 1840		
53	<i>Diomedea</i> Linnaeus, 1758	Альбатрос	[11]
54	<i>Phoebertia</i> Reichenbach, 1853	Бурий альбатрос	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Diomedea</i> (див. № 53 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Phoebertia fusca</i>
55	Procellariidae Leach, 1820		
56	<i>Bulweria</i> Bonaparte, 1843	Бульверія	[17]
57	<i>Calonectris</i> Mathews et Iredale, 1915	Строкатий буревісник	[20]
58	<i>Daption</i> Stephens, 1826	Пінтадо	Введено у цій праці; запозичено з англійської — “pintado”, за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]
59	<i>Fulmarus</i> Stephens, 1826	Фульмар	[11]
60	<i>Halobaena</i> Bonaparte, 1856	Блакитний буревісник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Puffinus</i> (див. № 66 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Halobaena caerulea</i>
61	<i>Macronectes</i> Richmond, 1905	Гігантський буревісник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Puffinus</i> (див. № 66 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Macronectes giganteus</i>
62	<i>Pachyptila</i> Illiger, 1811	Пріон	Введено у цій праці; запозичено з англійської — “prion”, за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]
63	<i>Pagodroma</i> Bonaparte, 1856	Білий буревісник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Puffinus</i> (див. № 66 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Pagodroma nivea</i>
64	<i>Procellaria</i> Linnaeus, 1758	Товстодзьобий буревісник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Puffinus</i> (див. № 66 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
65	<i>Pterodroma</i> Bonaparte, 1856	Тайфунник	[11]
66	<i>Puffinus</i> Brisson, 1760	Буревісник	[4]
67	<i>Thalassoica</i> Reichenbach, 1853	Антарктичний буревісник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Puffinus</i> (див. № 66 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Thalassoica antarctica</i>

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
68	Hydrobatidae Mathews, 1912		
69	Oceanitinae Forbes, 1882		
70	<i>Fregetta</i> Bonaparte, 1855	Фрегета	[17]
71	<i>Garrodia</i> Forbes, 1881	Сіроспинний океанник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Oceanites</i> (див. № 73 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Garrodia nereis</i>
72	<i>Nesofregetta</i> Mathews, 1912	Білогорлий океанник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Oceanites</i> (див. № 73 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Nesofregetta fuliginosa</i>
73	<i>Oceanites</i> Keyserling et J.H. Blasius, 1840	Океанник	Введено у цій праці; прототип української — лат. назва роду, видозмінена за нормами словотворення.
74	<i>Pelagodroma</i> Reichenbach, 1853	Білобровий океанник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Oceanites</i> (див. № 73 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Pelagodroma marina</i>
75	Hydrobatinae Mathews, 1912		
76	<i>Halocyptena</i> Coues, 1864	Каліфорнійська качурка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Hydrobates</i> (див. № 77 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Halocyptena microsoma</i>
77	<i>Hydrobates</i> Boie, 1822	Качурка	[11]
78	<i>Oceanodroma</i> Reichenbach, 1853	Вилохвоста качурка	[11]
79	Pelecanoididae G.R. Gray, 1871		
80	<i>Pelecanoides</i> Lacépède, 1799	Пуфінур	[17]
81	Pelecaniformes Sharpe, 1891		
82	Phaethontidae Brandt, 1840		
83	<i>Phaethon</i> Linnaeus, 1758	Фаетон	[11]
84	Pelecanidae Rafinesque, 1815		
85	<i>Pelecanus</i> Linnaeus, 1758	Пелікан	[4]
86	Sulidae Reichenbach, 1849		
87	<i>Sula</i> Brisson, 1760	Сула	[17]
88	Phalacrocoracidae Reichenbach, 1850		
89	<i>Phalacrocorax</i> Brisson, 1760	Баклан	[4]
90	Anhingidae Reichenbach, 1849		
91	<i>Anhinga</i> Brisson, 1760	Змієшийка	[11]
92	Fregatidae Degland et Gerbe, 1867		
93	<i>Fregata</i> Lacépède, 1799	Фрегат	[11]
94	Ciconiiformes Bonaparte, 1854		
95	Ardeidae Leach, 1820		
96	Ardeinae Leach, 1820		
97	<i>Agamia</i> Reichenbach, 1853	Агамія	[17]
98	<i>Ardea</i> Linnaeus, 1758	Чапля	[4]
99	<i>Ardeola</i> Boie, 1822	Жовта чапля	[20]
100	<i>Bubulcus</i> Bonaparte, 1855	Єгипетська чапля	[20]
101	<i>Butorides</i> Blyth, 1852	Мангрова чапля	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Ardea</i> (див. № 98 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Butorides striatus</i>
102	<i>Egretta</i> T. Forster, 1817	Чепура	[20]
103	<i>Pilherodius</i> Bonaparte, 1855	Неотропічна чапля	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Ardea</i> (див. № 98 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Pilherodius pileatus</i>
104	<i>Syrigma</i> Ridgway, 1878	Чапля-свистун	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Ardea</i> (див. № 380 у цій табл.); прикладка — переклад з латини, як в укр. назві виду <i>Syrigma sibilatrix</i>
105	Nycticoracinae Bonaparte, 1854		
106	<i>Cochlearius</i> Brisson, 1760	Широкодзьобий квак	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Nycticorax</i> (див. № 108 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Cochlearius cochlearius</i>
107	<i>Gorsachius</i> Bonaparte, 1855	Короткодзьобий квак	[11]

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
108	<i>Nycticorax</i> T. Forster, 1817	Квак	[4]
109	<i>Tigrisomatinae</i> Payne et Risley, 1976		
110	<i>Tigriornis</i> Sharpe, 1895	Смугаста бушля	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Tigrisoma</i> (див. № 111 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Tigriornis leucolophus</i>
111	<i>Tigrisoma</i> Swainson, 1827	Бушля	Введено у цій праці; синонім назви «чапля сіра» [23], рід належить до родини Чаплевих (Ardeidae)
112	<i>Zonerodius</i> Salvadori, 1882	Лісова бушля	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Tigrisoma</i> (див. № 111 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Zonerodius heliosylus</i>
113	<i>Botaurinae</i> Reichenbach, 1850		
114	<i>Botaurus</i> Stephens, 1819	Бугай	[4]
115	<i>Ixobrychus</i> Billberg, 1828	Бугайчик	[4]
116	<i>Zebrilus</i> Bonaparte, 1855	Гова	Введено у цій праці; синонім назви «чапля сіра» [23], рід належить до родини Чаплевих (Ardeidae)
117	<i>Scopidae</i> Bonaparte, 1849		
118	<i>Scopus</i> Brisson, 1760	Молотоголов	Введено у цій праці; прототипом стала рос. назва «молотоглав» [1], змінена за нормами словотворення в українській
119	<i>Ciconiidae</i> Sundevall, 1836		
120	<i>Anastomus</i> Bonaterre, 1791	Лелека-молюскоїд	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Ciconia</i> (див. № 121 у цій табл.); прикладку — через характер живлення усіх видів роду
121	<i>Ciconia</i> Brisson, 1760	Лелека	[4]
122	<i>Ephippiorhynchus</i> Bonaparte, 1855	Чорнокрилий ябіру	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Jabiru</i> (див. № 123 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
123	<i>Jabiru</i> Hellmayr, 1906	Ябіру	Введено у цій праці; транскрипція з лат. назви роду
124	<i>Leptoptilos</i> Lesson, 1831	Марабу	[11]
125	<i>Mycteria</i> Linnaeus, 1758	Міктерія	Транслітерація з лат. назви роду, вжита у цій праці
126	<i>Balaenicipitidae</i> Bonaparte, 1853		
127	<i>Balaeniceps</i> Gould, 1850	Китоголов	Назва «китоголав», запропонована для цього роду О. П. Маркевичем та К. І. Татарком [11], змінена у цій праці відповідно до норм укр. мови
128	<i>Threskiornithidae</i> Poche, 1904		
129	<i>Threskiornithinae</i> Poche, 1904		
130	<i>Bostrychia</i> Reichenbach, 1853	Африканський ібіс	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
131	<i>Cercibis</i> Wagler, 1832	Ібіс-довгохвіст	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); прикладка, як в укр. назві виду <i>Cercibis oxycerca</i> , за характерною прикметою
132	<i>Eudocimus</i> Wagler, 1832	Карибський ібіс	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
133	<i>Geronticus</i> Wagler, 1832	Ібіс-лисоголов	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); прикладка — неологізм, утворений через прикмету усіх видів роду
134	<i>Lophotibis</i> Reichenbach, 1853	Чубатий ібіс	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Lophotibis cristata</i>
135	<i>Mesembrinibis</i> Peters, 1930	Каєнський ібіс	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Mesembrinibis cayennensis</i>
136	<i>Nipponia</i> Reichenbach, 1853	Червононогий ібіс	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Nipponia nippon</i>
137	<i>Phimosus</i> Wagler, 1832	Чорний ібіс	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Phimosus infuscatus</i>
138	<i>Plegadis</i> Kaup, 1829	Коровайка	[4]

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
139	<i>Pseudibis</i> Hodgson, 1844	Південноазійський ібіс	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
140	<i>Theristicus</i> Wagler, 1832	Жовтоший ібіс	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Threskiornis</i> (див. № 141 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
141	<i>Threskiornis</i> G.R. Gray, 1842	Ібіс	[11]
142	<i>Plataleinae</i> Bonaparte, 1838		
143	<i>Platalea</i> Linnaeus, 1758	Косар	Другий синонім означення роду у М. А. Воїнственського, О. Б. Кістяківського [4]
144	<i>Phoenicopteriformes</i> Fürbringer, 1888		
145	<i>Phoenicopteridae</i> Bonaparte, 1831		
146	<i>Phoeniconaias</i> G.R. Gray, 1869	Малий фламінго	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Phoenicopterus</i> (див. № 148 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Phoeniconaias minor</i>
147	<i>Phoenicoparrus</i> Bonaparte, 1856	Андійський фламінго	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Phoenicopterus</i> (див. № 148 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Phoenicoparrus andinus</i>
148	<i>Phoenicopterus</i> Linnaeus, 1758	Фламінго	[4]
149	<i>Anseriformes</i> Wagler, 1831		
150	<i>Anhimidae</i> Stejneger, 1855		
151	<i>Anhima</i> Brisson, 1760	Паламедея	[11]
152	<i>Chauna</i> Illiger, 1811	Чайя	Введено у цій праці; запозичено з російської — «чайя» [1]
153	<i>Anatidae</i> Leach, 1820		
154	<i>Anseranatinae</i> P.L. Sclater, 1880		
155	<i>Anseranas</i> Lesson, 1828	Урако	Введено у цій праці; запозичено з іспанської — “urraco”, за “Handbook of the Birds...” [26]
156	<i>Anserinae</i> Vigors, 1825		
157	<i>Anser</i> Brisson, 1760	Гуска	[4]
158	<i>Branta</i> Scopoli, 1769	Казарка	[4]
159	<i>Cereopsis</i> Latham, 1801	Тасманійська гуска	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anser</i> (див. № 157 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Cereopsis novaehollandiae</i>
160	<i>Coscoroba</i> Reichenbach, 1853	Коскороба	[17]
161	<i>Cygnus</i> Bechstein, 1803	Лебідь	[4]
162	<i>Dendrocygna</i> Swainson, 1837	Свистач	Введено у цій праці; неологізм, пов'язаний зі словом «свистун», враховуючи рос. назву «свистящая утка» [1]
163	<i>Stictonetta</i> Reichenbach, 1853	Пато	[17]
164	<i>Thalassornis</i> Eyton, 1838	Стромярка	Введено у цій праці; запозичено зі словацької — “stromárka” [29]
165	<i>Anatinae</i> Leach, 1820		
166	<i>Aix</i> Boie, 1828	Мандаринка	[11]
167	<i>Alopochen</i> Stejneger, 1885	Нільська каргарка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Chloephaga</i> (див. № 177 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Alopochen aegyptiacus</i>
168	<i>Amazonetta</i> Boetticher, 1929	Бразильська чирянка	Введено у цій праці; переклад рос. назви «бразильский чирок» [1]
169	<i>Anas</i> Linnaeus, 1758	Качка	[4]
170	<i>Aythya</i> Boie, 1822	Чернь	[5]
171	<i>Biziura</i> Stephens, 1824	Сіра савка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Oxyura</i> (див. № 191 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Biziura lobata</i>
172	<i>Bucephala</i> Baird, 1858	Гоголь	[4]
173	<i>Callonetta</i> Delacour, 1936	Болівійська чирянка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують назву «чирянка»; прикметник, як в укр. назві виду <i>Callonetta leucophrys</i>
174	<i>Cairina</i> Fleming, 1822	Мускусна качка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Cairina moschata</i>

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
175	<i>Camptorhynchus</i> Bonaparte, 1838	Лабрадорська качка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Camptorhynchus labradorius</i>
176	<i>Chenonetta</i> Brandt, 1836	Гриваста качка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Chenonetta jubata</i>
177	<i>Chloephaga</i> Eyton, 1838	Каргарка	Введено у цій праці; вжито синонім назви «гуска білолоба» [23], через подібність до гусей
178	<i>Clangula</i> Leach, 1819	Морянка	[4]
179	<i>Cyanochen</i> Bonaparte, 1856	Ефіопська каргарка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Chloephaga</i> (див. № 177 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Cyanochen cyanopterus</i>
180	<i>Heteronetta</i> Salvadori, 1865	Чорноголова качка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Heteronetta atricapilla</i>
181	<i>Histrionicus</i> Lesson, 1828	Каменярка	[11]
182	<i>Hymenolaimus</i> Gray, 1843	Новозеландська качка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Hymenolaimus malacorhynchos</i>
183	<i>Malacorhynchus</i> Swainson, 1831	Качка-лопатоніс	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикладку — через форму дзьоба птахів єдиного виду у роді
184	<i>Marmaronetta</i> Reichenbach, 1853	Вузькодзьоба чирянка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують назву «чирянка»; прикметник, як в укр. назві виду <i>Marmaronetta angustirostris</i>
185	<i>Melanitta</i> Boie, 1822	Турпан	[4]
186	<i>Merganetta</i> Gould, 1842	Андійська качка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Merganetta armata</i>
187	<i>Mergus</i> Linnaeus, 1758	Крех	[20]
188	<i>Neochen</i> Oberholser, 1918	Гриваста каргарка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Chloephaga</i> (див. № 177 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Neochen jubata</i>
189	<i>Netta</i> Kaup, 1829	Червонодзьоба чернь	[4]
190	<i>Nettapus</i> Brandt, 1836	Чирянка-крихітка	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують назву «чирянка»; прикладку — через розміри птахів усіх видів роду
191	<i>Oxyura</i> Bonaparte, 1828	Савка	[4]
192	<i>Plectropterus</i> Stephens, 1824	Шпорокрил	Введено у цій праці; неологізм, утворений з огляду на рос. назву «шпорцевый гусь» [1]
193	<i>Polysticta</i> Eyton, 1836	Мала пухівка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Somateria</i> (див. № 197 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Polysticta stelleri</i>
194	<i>Pteronetta</i> Salvadori, 1895	Екваторіальна качка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Pteronetta hartlaubii</i>
195	<i>Rhodonessa</i> Reichenbach, 1853	Рожевоголова качка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Rhodonessa caryophyllacea</i>
196	<i>Sarkidiornis</i> Eyton, 1838	Шишкодзьоба качка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Anas</i> (див. № 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Sarkidiornis melanotos</i>
197	<i>Somateria</i> Leach, 1819	Пухівка	[20]
198	<i>Tachyeres</i> Owen, 1875	Качка-пароплав	Введено у цій праці; переклад з рос. назви роду — «утка-пароход» [1]
199	<i>Tadorna</i> Boie, 1822	Галагаз	[4]
200	Falconiformes Bonaparte, 1831		
201	Cathartidae Lafresnaye, 1839		
202	<i>Cathartes</i> Illiger, 1811	Катарта	Введено у цій праці; запозичено з російської — «катарта» [1], походить від лат. назви роду

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
203	<i>Coragyps</i> I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1853	Урубубу	Введено у цій праці; запозичено з французької — “urubu”, за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флінта [1]
204	<i>Gymnogyps</i> Lesson, 1842	Каліфорнійський кондор	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Vultur</i> (див. № 206 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Gymnogyps californianus</i>
205	<i>Sarcorhamphus</i> Duméril, 1806	Королівський кондор	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Vultur</i> (див. № 206 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Sarcorhamphus papa</i>
206	<i>Vultur</i> Linnaeus, 1758	Кондор	[11]
207	<i>Pandionidae</i> Bonaparte, 1854		
208	<i>Pandion</i> Savigny, 1809	Скопа	[4]
209	<i>Accipitridae</i> Vigors, 1824		
210	<i>Accipiter</i> Brisson, 1760	Яструб	[4]
211	<i>Aegyptius</i> Savigny, 1809	Гриф	[20]
212	<i>Aquila</i> Brisson, 1760	Орел	[23]
213	<i>Aviceda</i> Swainson, 1836	Шуляк	Введено у цій праці; синонім назви «шуліка чорний» [23], рід близькоспоріднений з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.)
214	<i>Busarellus</i> Lesson, 1843	Канюк-рибалка	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Buteo</i> (див. № 216 у цій табл.); прикладку — через характер живлення усіх видів роду
215	<i>Butastur</i> Hodgson, 1843	Яструбиний канюк	[11]
216	<i>Buteo</i> Lacépède, 1799	Канюк	[4]
217	<i>Buteogallus</i> Lesson, 1830	Канюк-крабоїд	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Buteo</i> (див. № 216 у цій табл.); прикладку — через характер живлення усіх видів роду
218	<i>Chelictinia</i> Lesson, 1843	Вилохвостий шуліка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Chelictinia riocourii</i>
219	<i>Chondrohierax</i> Lesson, 1843	Гачкодзьобий шуляк	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aviceda</i> (див. № 213 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Chondrohierax uncinatus</i>
220	<i>Circaetus</i> Vieillot, 1816	Зміїд	[4]
221	<i>Circus</i> Lacépède, 1799	Лунь	[4]
222	<i>Dryotriorchis</i> Shelley, 1874	Конголезський зміїд	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Circaetus</i> (див. № 220 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Dryotriorchis spectabilis</i>
223	<i>Elanoides</i> Vieillot, 1818	Вилохвостий лунь	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Circus</i> (див. № 221 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Elanoides forficatus</i>
224	<i>Elanus</i> Savigny, 1809	Сірий шуліка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.); узагальнююче прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
225	<i>Erythrotriorchis</i> Sharpe, 1875	Рудий яструб	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Accipiter</i> (див. № 210 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Erythrotriorchis radiatus</i>
226	<i>Eutriorchis</i> Sharpe, 1875	Мадагаскарський зміїд	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Circaetus</i> (див. № 220 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Eutriorchis astur</i>
227	<i>Gampsonyx</i> Vigors, 1825	Шуліка-крихітка	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.); прикладку — через малі розміри птахів цього роду
228	<i>Geranoaetus</i> Kaup, 1844	Агуя	Введено у цій праці; запозичено з німецької — “aguja”, за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флінта [1]
229	<i>Geranospiza</i> Kaup, 1847	Яструб-довгоніг	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Accipiter</i> (див. № 210 у цій табл.); прикладку — через особливості птахів
230	<i>Gypaetus</i> Storr, 1784	Ягнятник	[11]
231	<i>Gypohierax</i> Rüppell, 1836	Пальмовий гриф	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aegyptius</i> (див. № 211 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Gypohierax angolensis</i>
232	<i>Gyps</i> Savigny, 1809	Сип	[4]

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
233	<i>Haliaeetus</i> Savigny, 1809	Орлан	[4]
234	<i>Haliastur</i> Selby, 1840	Брамінський шуліка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, запозичене з рос. назви роду [1]
235	<i>Hamirostra</i> T. Brown, 1846	Рудоший шуліка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Hamirostra melanosternon</i>
236	<i>Harpagus</i> Vigors, 1824	Шуліка-зубодзьоб	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.); прикладку — через особливість будови дзьоба в усіх видів роду
237	<i>Harpia</i> Vieillot, 1816	Гарпія	[11]
238	<i>Harpyhaliaetus</i> Lafresnaye, 1842	Орел-самітник	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Aquila</i> (див. № 212 у цій табл.); прикладка — переклад з рос. лексеми «отшельник» [1]
239	<i>Harpyopsis</i> Salvadori, 1875	Новогвінейська гарпія	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Harpia</i> (див. № 237 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Harpyopsis novaeguineae</i>
240	<i>Henicopernis</i> G.R. Gray, 1859	Осоїд-довгохвіст	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Pernis</i> (див. № 260 у цій табл.); прикладку — через прикмету усіх видів роду
241	<i>Hieraaetus</i> Kaup, 1844	Орел-карлик	[10]
242	<i>Ichthyophaga</i> Lesson, 1843	Орлан-рибалка	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Haliaeetus</i> (див. № 233 у цій табл.); прикладка — переклад з рос. лексеми «рыболов» [1]
243	<i>Ictinaetus</i> Blyth, 1843	Чорний орел	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aquila</i> (див. № 212 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Ictinaetus malayensis</i>
244	<i>Ictinia</i> Vieillot, 1816	Американський шуліка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
245	<i>Kaupifalco</i> Bonaparte, 1854	Яструб-ящірковол	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Accipiter</i> (див. № 210 у цій табл.); прикладка, як в укр. назві виду <i>Kaupifalco monogrammicus</i> , за особливістю живлення
246	<i>Leptodon</i> Sundevall, 1836	Каєнський шуляк	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aviceda</i> (див. № 213 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Leptodon cayanensis</i>
247	<i>Leucopternis</i> Kaup, 1847	Неотропічний канюк	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Buteo</i> (див. № 216 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
248	<i>Lophaetus</i> Kaup, 1847	Довгочубий орел	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aquila</i> (див. № 212 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Lophaetus occipitalis</i>
249	<i>Lophoictinia</i> Kaup, 1847	Довгокрилий шуліка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Lophoictinia isura</i>
250	<i>Macheiramphus</i> Bonaparte, 1850	Шуліка-широкорот	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Milvus</i> (див. № 254 у цій табл.); прикладка, як в укр. назві виду <i>Macheiramphus alcinus</i> , за особливою прикметою
251	<i>Megatriorchis</i> Salvadori et D'Albertis, 1875	Новогвінейський яструб	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Accipiter</i> (див. № 210 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Megatriorchis doriae</i>
252	<i>Melierax</i> G.R. Gray, 1840	Яструб-крикун	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Accipiter</i> (див. № 210 у цій табл.); прикладку — через особливість поведінки усіх видів роду
253	<i>Micronisus</i> G.R. Gray, 1840	Габар	Введено у цій праці; вжито індивідуалізоване видове означення виду <i>Micronisus gabar</i> , єдиного у цьому роді
254	<i>Milvus</i> Lacépède, 1799	Шуліка	[4]
255	<i>Morphnus</i> Dumont, 1816	Гвіанська гарпія	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Harpia</i> (див. № 237 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Morphnus guianensis</i>

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
256	<i>Necrosyrtes</i> Gloger, 1841	Бурий стерв'ятник	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Neophron</i> (див. № 257 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Necrosyrtes monachus</i>
257	<i>Neophron</i> Savigny, 1809	Стерв'ятник	[4]
258	<i>Oroaetus</i> Ridgway, 1920	Орел Ісідори	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aquila</i> (див. № 212 у цій табл.); через персоналізоване видове означення у лат. назві виду <i>Oroaetus isidori</i> , єдиного в роді, фонетична форма укр. назв роду і виду однакова
259	<i>Parabuteo</i> Ridgway, 1874	Пустельний канюк	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Buteo</i> (див. № 216 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Parabuteo unicinctus</i>
260	<i>Pernis</i> Cuvier, 1817	Осоїд	[4]
261	<i>Pithecophaga</i> Ogilvie-Grant, 1896	Філіпінська гарпія	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Harpia</i> (див. № 237 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Pithecophaga jefferyi</i>
262	<i>Polemaetus</i> Heine, 1890	Орел-боєць	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Aquila</i> (див. № 212 у цій табл.); прикладка — видозмінений переклад рос. лексеми «боевой» [1]
263	<i>Polyboroides</i> A. Smith, 1829	Яструб-сивець	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Accipiter</i> (див. № 210 у цій табл.); прикладку — через особливість забарвлення усіх видів роду
264	<i>Rostrhamus</i> Lesson, 1830	Шуліка-слимакоїд	Введено у цій праці; переклад рос. назви «коршун-слизнеєд» [1]
265	<i>Sarcogyps</i> Lesson, 1842	Червоноголовий гриф	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aegyrius</i> (див. № 211 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Sarcogyps calvus</i>
266	<i>Spilornis</i> G.R. Gray, 1840	Чубатий зміїд	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Circaetus</i> (див. № 220 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Spilornis cheela</i>
267	<i>Spizaetus</i> Vieillot, 1916	Орел-чубань	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Aquila</i> (див. № 212 у цій табл.); прикладку — через прикмету оперення усіх видів роду
268	<i>Spizastur</i> G.R. Gray, 1841	Строкатий орел	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aquila</i> (див. № 212 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Spizastur melanoleucus</i>
269	<i>Stephanoaetus</i> W.L. Sclater, 1922	Вінценосний орел	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aquila</i> (див. № 212 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Stephanoaetus coronatus</i>
270	<i>Terathopius</i> Lesson, 1830	Орел-блазень	Введено у цій праці; переклад рос. назви «орёл-скоморох» [1]
271	<i>Torgos</i> Kaup, 1828	Африканський гриф	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aegyrius</i> (див. № 211 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Torgos tracheliotus</i>
272	<i>Trigonoceps</i> Lesson, 1842	Білоголовий гриф	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Aegyrius</i> (див. № 211 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Trigonoceps occipitalis</i>
273	<i>Urotriorchis</i> Sharpe, 1874	Довгохвостий яструб	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Accipiter</i> (див. № 210 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Urotriorchis macrourus</i>
274	Sagittariidae Finsch et Hartlaub, 1870		
275	<i>Sagittarius</i> Herman, 1783	Секретар	[11]
276	Falconidae Leach, 1820		
277	Polyborinae Bonaparte, 1838		
278	<i>Daptrius</i> Vieillot, 1816	Чорна каракара	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Polyborus</i> (див. № 283 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Daptrius ater</i>
279	<i>Herpetotheres</i> Vieillot, 1817	Макагуа	[17]
280	<i>Micrastur</i> G.R. Gray, 1841	Рарія	Введено у цій праці; синонім назви «балабана» [23], рід належить до родини Соколових (Falconidae)
281	<i>Milvago</i> Spix, 1824	Каракара-крикун	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Polyborus</i> (див. № 283 у цій табл.); прикладку — через особливість поведінки усіх видів роду

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
282	<i>Phalcoboenus</i> d'Orbigny, 1834	Гірська каракара	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Polyborus</i> (див. № 283 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за біотопом поширення усіх видів роду
283	<i>Polyborus</i> Vieillot, 1816	Каракара	[11]
284	Falconinae Leach, 1820		
285	<i>Falco</i> Linnaeus, 1758	Сокіл	[4]
286	<i>Microhierax</i> Sharpe, 1874	Сокіл-карлик	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Falco</i> (див. № 285 у цій табл.); прикладку — через малі розміри усіх видів роду
287	<i>Polihierax</i> Kaup, 1847	Сокіл-крихітка	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Falco</i> (див. № 285 у цій табл.); прикладку — через дрібні розміри усіх видів роду
288	<i>Spiziapteryx</i> Kaup, 1852	Плямистокрилий сокіл	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Falco</i> (див. № 285 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Spiziapteryx circumcinctus</i>
289	Galliformes Temminck, 1820		
290	Megapodiidae Lesson, 1831		
291	<i>Aepyodius</i> Oustalet, 1880	Чагарниковий великоніг	Введено у цій праці; поріднений з родом <i>Megapodius</i> (див. № 296 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за біотопом поширення усіх видів роду
292	<i>Alectura</i> Latham, 1824	Східний великоніг	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Megapodius</i> (див. № 296 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Alectura lathamii</i>
293	<i>Eulipoa</i> Ogilvie-Grant, 1893	Молуцький великоніг	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Megapodius</i> (див. № 296 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Eulipoa wallacei</i>
294	<i>Leipoa</i> Gould, 1840	Строкатий великоніг	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Megapodius</i> (див. № 296 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Leipoa ocellata</i>
295	<i>Macrocephalon</i> S. Müller, 1846	Малео	Введено у цій праці; запозичено з англійської — “maleo”, за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флінта [1]
296	<i>Megapodius</i> Gaimard, 1823	Великоніг	[17]
297	<i>Talegalla</i> Lesson, 1828	Новогвінейський великоніг	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Megapodius</i> (див. № 296 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
298	Cracidae Rafinesque, 1815		
299	Penelopinae Bonaparte, 1831		
300	<i>Aburria</i> Reichenbach, 1853	Абури	[17]
301	<i>Chamaepetes</i> Wagler, 1832	Чорна пенелопа	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Penelope</i> (див. № 304 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Chamaepetes unicolor</i>
302	<i>Oreophasis</i> G.R. Gray, 1844	Рогата пенелопа	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Penelope</i> (див. № 304 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Oreophasis derbianus</i>
303	<i>Ortalis</i> Merrem, 1786	Чачалака	Введено у цій праці; запозичено з російської — «чачалака» [1]
304	<i>Penelope</i> Merrem, 1786	Пенелопа	[17]
305	<i>Penelopina</i> Reichenbach, 1862	Мексиканська пенелопа	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Penelope</i> (див. № 304 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Penelopina nigra</i>
306	<i>Pipile</i> Bonaparte, 1856	Абури-крикун	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Aburria</i> (див. № 300 у цій табл.); прикладку — через особливості поведінки усіх видів роду
307	Cracinae Rafinesque, 1815		
308	<i>Crax</i> Linnaeus, 1758	Кракс	[11]
309	<i>Mitu</i> Lesson, 1831	Міту	[17]
310	<i>Nothocrax</i> Burmeister, 1856	Гоко	Введено у цій праці; запозичено з французької — “hocco”, за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флінта [1]
311	<i>Pauxi</i> Temminck, 1813	Кракс-рогань	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Crax</i> (див. № 308 у цій табл.); прикладку — через рогоподібний виріст в усіх видів роду
312	Meleagrididae G.R. Gray, 1840		
313	<i>Meleagris</i> Linnaeus, 1758	Індик	[11]
314	Tetraonidae Leach, 1820		

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
315	<i>Bonasa</i> Stephens, 1819	Боназа	Транскрипція з лат. назви роду, вжита у цій праці
316	<i>Centrocercus</i> Swainson, 1832	Гострохвостий тетерук	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Tetrao</i> (див. № 320 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують назву «тетерук»; прикметник, як в укр. назві виду <i>Centrocercus urophasianus</i>
317	<i>Dendragapus</i> Elliot, 1864	Жовтобровий тетерук	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Tetrao</i> (див. № 320 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують назву «тетерук»; прикметник, як в укр. назві виду <i>Dendragapus obscurus</i>
318	<i>Falcipectnis</i> Elliot, 1864	Дикуша	[11]
319	<i>Lagopus</i> Brisson, 1760	Біла куріпка	[4]
320	<i>Tetrao</i> Linnaeus, 1758	Глушець	[20]
321	<i>Tympanuchus</i> Gloger, 1842	Лучний тетерук	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Tetrao</i> (див. № 320 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують назву «тетерук»; прикметник, як в укр. назві виду <i>Tympanuchus cupido</i>
322	Odontophoridae Gould, 1844		
323	<i>Callipepla</i> Wagler, 1832	Перепелиця	Введено у цій праці; вжито синонім назви «перепілка» [23], через подібність птахів
324	<i>Colinus</i> Goldfuss, 1820	Американська перепелиця	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Callipepla</i> (див. № 323 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
325	<i>Cyrtonyx</i> Gould, 1844	Перепелиця-клоун	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Callipepla</i> (див. № 323 у цій табл.); прикладку — через зовнішній вигляд усіх видів роду
326	<i>Dactylortyx</i> Ogilvie-Grant, 1893	Довгопала перепелиця	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Callipepla</i> (див. № 323 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Dactylortyx thoracicus</i>
327	<i>Dendrortyx</i> Gould, 1844	Довгохвоста перепелиця	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Callipepla</i> (див. № 323 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
328	<i>Odontophorus</i> Vieillot, 1816	Токро	Введено у цій праці; запозичено з французької — «tocro», за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флонта [1]
329	<i>Oreortyx</i> Baird, 1858	Гірська перепелиця	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Callipepla</i> (див. № 323 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Oreortyx pictus</i>
330	<i>Philortyx</i> Gould, 1846	Смугаста перепелиця	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Callipepla</i> (див. № 323 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Philortyx fasciatus</i>
331	<i>Rhynchortyx</i> Ogilvie-Grant, 1893	Рудоцока перепелиця	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Callipepla</i> (див. № 323 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Rhynchortyx cinctus</i>
332	Phasianidae Horsfield, 1821		
333	Perdicinae Horsfield, 1821		
334	<i>Alectoris</i> Kaup, 1829	Кеклик	[5]
335	<i>Ammoperdix</i> Gould, 1851	Пустельна куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Ammoperdix griseogularis</i>
336	<i>Anurophasis</i> van Oort, 1910	Новогвінейська перепілка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Coturnix</i> (див. № 340 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Anurophasis monorthonyx</i>
337	<i>Arborophila</i> Hodgson, 1837	Чагарникова куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Arborophila torqueola</i>
338	<i>Bambusicola</i> Gould, 1863	Бамбукова куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Bambusicola fytchii</i>
339	<i>Caloperdix</i> Blyth, 1861	Куропатиця	Введено у цій праці; вжито синонім назви «куріпка» [23], через подібність птахів
340	<i>Coturnix</i> Bonnaterre, 1791	Перепілка	[20]
341	<i>Francolinus</i> Stephens, 1819	Турач	[11]
342	<i>Galloperdix</i> Blyth, 1844	Куріпка-шпороніг	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикладка — видозмінений переклад з частини рос. назви «шпорцевая куропатка» [1]

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
343	<i>Haematortyx</i> Sharpe, 1879	Червоноголова куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Haematortyx sanguiniceps</i>
344	<i>Lerwa</i> Hodgson, 1837	Сніжна куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Lerwa lerwa</i>
345	<i>Margaroperdix</i> Reichenbach, 1853	Мадагаскарська куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Margaroperdix madagarensis</i>
346	<i>Melanoperdix</i> Jerdon, 1864	Чорна куріпка	[17]
347	<i>Ophrysia</i> Bonaparte, 1856	Гімалайська перепілка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Coturnix</i> (див. № 340 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Ophrysia superciliosa</i>
348	<i>Perdicula</i> Hodgson, 1837	Чагарникова перепілка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Coturnix</i> (див. № 340 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Perdicula asiatica</i>
349	<i>Perdix</i> Brisson, 1760	Куріпка	[4]
350	<i>Ptilopachus</i> Swainson, 1837	Скельна куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Ptilopachus petrosus</i>
351	<i>Rhizothera</i> G.R. Gray, 1841	Довгохвоста куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Rhizothera longirostris</i>
352	<i>Rollulus</i> Bonnatere, 1791	Червоночуба куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Rollulus rouloul</i>
353	<i>Tetraogallus</i> J.E. Gray, 1832	Улар	[11]
354	<i>Tetraophasis</i> Elliot, 1871	Кундик	Введено у цій праці; запозичено з російської — «кундык» [1]
355	<i>Xenoperdix</i> Dinesen et al., 1994	Африканська куріпка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Perdix</i> (див. № 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Xenoperdix undzungwensis</i>
356	Phasianinae Horsfield, 1821		
357	<i>Afropavo</i> Chapin, 1936	Африканський павич	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Pavo</i> (див. № 366 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Afropavo congensis</i>
358	<i>Argusianus</i> Rafinesque, 1815	Аргус	[11]
359	<i>Catreus</i> Cabanis, 1851	Гімалайський фазан	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Phasianus</i> (див. № 367 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Catreus wallichii</i>
360	<i>Chrysolophus</i> J.E. Gray, 1834	Золотий фазан	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Phasianus</i> (див. № 367 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Chrysolophus pictus</i>
361	<i>Crossoptilon</i> Hodgson, 1838	Фазан-вухань	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Phasianus</i> (див. № 367 у цій табл.); прикладку — через оздобні пера на голові у вигляді «вушок» у птахів усіх видів роду
362	<i>Gallus</i> Brisson, 1760	Курка	[11]
363	<i>Ithaginis</i> Wagler, 1832	Ітагін	[17]
364	<i>Lophophorus</i> Temminck, 1813	Монал	Введено у цій праці; запозичено з російської — «монал» [1]
365	<i>Lophura</i> Fleming, 1822	Лофур	Введено у цій праці; транскрипція з лат. назви роду, зі зміною жіночого роду в латині на чоловічий рід в українській, подібно до роду <i>Fregata</i> — Фрегат [11]
366	<i>Pavo</i> Linnaeus, 1758	Павич	[11]
367	<i>Phasianus</i> Linnaeus, 1758	Фазан	[4]
368	<i>Polyplectron</i> Temminck, 1813	Віялохвіст	Введено у цій праці; назву індивідуалізовано за особливістю оперення усіх видів роду
369	<i>Pucrasia</i> G.R. Gray, 1841	Коклас	Введено у цій праці; запозичено з російської — «коклас» [1]
370	<i>Rheinardia</i> Maingonnat, 1882	Чубатий аргус	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Argusianus</i> (див. № 358 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Rheinardia ocellata</i>
371	<i>Syrmaticus</i> Wagler, 1832	Мікадо	Введено у цій праці; як укр. назву роду вжито транслітерацію з видового означення у лат. назві виду <i>Syrmaticus mikado</i>

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
372	<i>Tragopan</i> Cuvier, 1829	Трагопан	[17]
373	Numididae de Selys Longchamps, 1842		
374	<i>Acryllium</i> G.R. Gray, 1840	Синьогруда цесарка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Numida</i> (див. № 377 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Acryllium vulturinum</i>
375	<i>Agelastes</i> Bonaparte, 1850	Чорна цесарка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Numida</i> (див. № 377 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Agelastes niger</i>
376	<i>Guttera</i> Wagler, 1832	Чубата цесарка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Numida</i> (див. № 377 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Guttera pucherani</i>
377	<i>Numida</i> Linnaeus, 1766	Цесарка	[11]
378	Opisthocomiformes L'Herminier, 1837		
379	Opisthocomidae Swainson, 1837		
380	<i>Opisthocomus</i> Illiger, 1811	Гоацин	[11]
381	Gruiformes Bonaparte, 1854		
382	Mesitornithidae Wetmore, 1960		
383	<i>Mesitornis</i> Bonaparte, 1855	Роутело	Введено у цій праці; запозичено з англійської — “roatelo” за правилом вимови, за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флінта [1]
384	<i>Monias</i> Oustalet et G. Grandidier, 1903	Монія	[17]
385	Turnicidae G.R. Gray, 1840		
386	<i>Ortyxelos</i> Vieillot, 1825	Триперстка-крихітка	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Turnix</i> (див. № 387 у цій табл.); прикладку — через розміри птахів єдиного виду роду
387	<i>Turnix</i> Bonnaterre, 1791	Триперстка	[11]
388	Gruidae Vigors, 1825		
389	Balearicinae Brazil, 1913		
390	<i>Balearica</i> Brisson, 1760	Вінценос	Введено у цій праці; неологізм, утворений на основі назви «вінценосний журавель» [11], для спрощення утворення назви вищого таксона
391	Gruinae Vigors, 1825		
392	<i>Anthropoides</i> Vieillot, 1816	Степовий журавель	[10]
393	<i>Buggeranus</i> Gloger, 1842	Білоший журавель	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Grus</i> (див. № 394 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Buggeranus carunculatus</i>
394	<i>Grus</i> Pallas, 1766	Журавель	[4]
395	Aramidae Bonaparte, 1842		
396	<i>Aramus</i> Vieillot, 1816	Арама	Введено у цій праці; транслітерація з лат. назви роду, зі зміною чоловічого роду в латині на жіночий рід в українській, як в рос. назві роду [1]
397	Psophiidae Bonaparte, 1831		
398	<i>Psophia</i> Linnaeus, 1758	Агамі	Введено у цій праці; другий синонім виду <i>Psophia crepitans</i> , вжитий О. П. Маркевичем, К. І. Татарком [11]
399	Rallidae Rafinesque, 1815		
400	<i>Aenigmatolimnas</i> J.L. Peters, 1932	Буроголовий погонич	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Porzana</i> (див. № 429 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Aenigmatolimnas marginalis</i>
401	<i>Amaurolimnas</i> Sharpe, 1893	Бурий пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Amaurolimnas concolor</i>
402	<i>Amaurornis</i> Reichenbach, 1853	Багновик	Введено у цій праці; прототипом стала пол. назва — “bagiewnik” [30]
403	<i>Anurolimnas</i> Sharpe, 1893	Неотропичний деркач	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Crex</i> (див. № 410 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
404	<i>Aphanapteryx</i> Frauenfeld, 1874	Іржастий пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Aphanapteryx bonasia</i>

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
405	<i>Aramides</i> Pucheran, 1845	Неотропічний пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
406	<i>Aramidopsis</i> Sharpe, 1893	Сулавеський пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Aramidopsis plateni</i>
407	<i>Atlantisia</i> Lowe, 1923	Тристанський пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Atlantisia rogersi</i>
408	<i>Canirallus</i> Bonaparte, 1856	Пастушок-сіродзьоб	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикладка — неологізм, утворений через забарвлення дзьоба птахів усіх видів роду
409	<i>Coturnicops</i> G.R. Gray, 1855	Погонич-пігмей	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Porzana</i> (див. № 429 у цій табл.); прикладку — через розміри птахів усіх видів роду
410	<i>Crex</i> Bechstein, 1803	Деркач	[4]
411	<i>Cyanolimnas</i> Barbour et J. L. Peters, 1927	Кубинський погонич	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Porzana</i> (див. № 429 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Cyanolimnas cerverai</i>
412	<i>Dryolimnas</i> Sharpe, 1893	Білогорлий пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Dryolimnas cuvieri</i>
413	<i>Eulabeornis</i> Gould, 1844	Мангровий пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Eulabeornis castaneoventris</i>
414	<i>Fulica</i> Linnaeus, 1758	Лиска	[4]
415	<i>Gallixrex</i> Blyth, 1852	Рогата курочка	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Gallinula</i> (див. № 416 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Gallixrex cinerea</i>
416	<i>Gallinula</i> Brisson, 1760	Курочка	[20]
417	<i>Gallirallus</i> Lafresnaye, 1841	Південний пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, через розташування ареалів усіх видів роду
418	<i>Gymnocrex</i> Salvadori, 1875	Пастушок-голоок	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикладка — неологізм, утворений через голу шкіру навколо очей у птахів усіх видів роду
419	<i>Habroptila</i> G.R. Gray, 1860	Гальмаберський пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Habroptila walacii</i>
420	<i>Himantornis</i> Hartlaub, 1855	Червононогий пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Himantornis haematopus</i>
421	<i>Laterallus</i> G.R. Gray, 1855	Неотропічний погонич	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Porzana</i> (див. № 429 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
422	<i>Lewinia</i> G.R. Gray, 1855	Левинія	Транскрипція з лат. назви роду, вжита у цій праці
423	<i>Megacrex</i> D'Albertis et Salvadori, 1879	Новогвінейський пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Megacrex inepta</i>
424	<i>Micropygia</i> Bonaparte, 1856	Венесуельський пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Micropygia schomburgkii</i>
425	<i>Neocrex</i> P.L. Sclater et Salvin, 1868	Золотодзьобий пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Neocrex erythrops</i>
426	<i>Nesoclopeus</i> J.L. Peters, 1932	Фіджійський пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Nesoclopeus poecilopterus</i>
427	<i>Pardirallus</i> Bonaparte, 1856	Строкатий пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Pardirallus maculatus</i>

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
428	<i>Porphyrio</i> Brisson, 1760	Султанка	[20]
429	<i>Porzana</i> Vieillot, 1816	Погонич	[4]
430	<i>Rallina</i> G.R. Cray, 1846	Азійський погонич	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Porzana</i> (див. № 431 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за регіоном поширення усіх видів роду
431	<i>Rallus</i> Linnaeus, 1758	Пастушок	[4]
432	<i>Rougetius</i> Bonaparte, 1856	Ефіопський пастушок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rallus</i> (див. № 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Rougetius rougetii</i>
433	<i>Sarothrura</i> Heine, 1890	Африканський погонич	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Porzana</i> (див. № 429 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Sarothrura boehmi</i>
434	<i>Heliornithidae</i> G.R. Gray, 1840		
435	<i>Heliopais</i> Sharpe, 1843	Азійський лапчастоніг	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Heliornis</i> (див. № 436 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Heliopais personata</i>
436	<i>Heliornis</i> Bonnaterre, 1791	Лапчастоніг	[11]
437	<i>Podica</i> Lesson, 1831	Африканський лапчастоніг	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Heliornis</i> (див. № 436 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Podica senegalensis</i>
438	<i>Rhynchotidae</i> Carus, 1868		
439	<i>Rhynchotos</i> J. Verreaux et Des Murs, 1860	Кагу	[9]
440	<i>Eurypygidae</i> Selby, 1840		
441	<i>Eurypyga</i> Illiger, 1811	Тігана	Введено у цій праці; запозичено з іспанської — “tigana”, за «Handbook of the Birds...» [28]
442	<i>Cariamidae</i> Bonaparte, 1850		
443	<i>Cariama</i> Brisson, 1760	Каріама	Транслітерація з лат. назви роду, вжита у цій праці
444	<i>Chunga</i> Hartlaub, 1860	Чорнонога каріама	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Cariama</i> (див. № 443 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Chunga burmeisteri</i>
445	<i>Otididae</i> Rafinesque, 1815		
446	<i>Afrotis</i> G.R. Gray, 1855	Чорна дрохва	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Otis</i> (див. № 454 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Afrotis afra</i> .
447	<i>Ardeotis</i> Le Mahout, 1853	Велика дрохва	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Otis</i> (див. № 454 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою в розмірах усіх видів роду
448	<i>Chlamydotis</i> Lesson, 1839	Джек	[20]
449	<i>Eupodotis</i> Lesson, 1839	Корхаан	Введено у цій праці; запозичено з англійської — “korhaan”, за словником Р. Л. Беме, В. Е. Флинта [1]
450	<i>Houbaropsis</i> Sharpe, 1893	Бенгальський флорікан	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Sypheotides</i> (див. № 455 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Houbaropsis bengalensis</i>
451	<i>Lissotis</i> Reichenbach, 1848	Чорночерева дрохва	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Otis</i> (див. № 454 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Lissotis melanogaster</i>
452	<i>Lophotis</i> Reichenbach, 1848	Чубата дрохва	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Otis</i> (див. № 454 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
453	<i>Neotis</i> Sharpe, 1893	Темнохвоста дрохва	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Otis</i> (див. № 454 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
454	<i>Otis</i> Linnaeus, 1758	Дрохва	[5]
455	<i>Sypheotides</i> Lesson, 1839	Флорікан	Введено у цій праці; запозичено з англійської — “florican”, за словником Р. Л. Беме, В. Е. Флинта [1]
456	<i>Tetrax</i> T. Forster, 1817	Хохітва	[20]
457	<i>Charadriiformes</i> Huxley, 1867		
458	<i>Jacaniidae</i> Chenu et des Murs, 1854		
459	<i>Actophilornis</i> Oberholser, 1899	Африканська якана	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Jacana</i> (див. № 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Actophilornis africanus</i>

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
460	<i>Hydrophasianus</i> Wagler, 1832	Довгохвоста якана	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Jacana</i> (див. № 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Hydrophasianus chirurgus</i>
461	<i>Irediparra</i> Mathews, 1911	Гребінчаста якана	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Jacana</i> (див. № 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Irediparra gallinacea</i>
462	<i>Jacana</i> Brisson, 1760	Якана	[11]
463	<i>Metopidius</i> Wagler, 1832	Білоброва якана	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Jacana</i> (див. № 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Metopidius indicus</i>
464	<i>Microparra</i> Cabanis, 1877	Мала якана	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Jacana</i> (див. № 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Microparra capensis</i>
465	Rostratulidae Mathews, 1913		
466	<i>Nycticryphes</i> Wetmore et J. L. Peters, 1923	Аргентинський мальованець	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Rostratula</i> (див. № 467 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Nycticryphes semicollaris</i>
467	<i>Rostratula</i> Vieillot, 1816	Мальованець	Для означення роду використано назву, яка відображає особливості забарвлення оперення птаха, вжиту М. А. Воїнственським [3] стосовно виду <i>Carduelis carduelis</i> (Fringillidae, Passeriformes), хоча за цим видом усталилась назва «щиглик»
468	Dromadidae G.R. Gray, 1840		
469	<i>Dromas</i> Paykull, 1805	Крабоїд	Введено у цій праці; вжито через характер живлення єдиного виду в роду
470	Haematopodidae Bonaparte, 1838		
471	<i>Haematopus</i> Linnaeus, 1758	Кулик-сорока	[4]
472	Ibidorhynchidae Bonaparte, 1856		
473	<i>Ibidorhyncha</i> Vigors, 1832	Серподзьоб	[11]
474	Recurvirostridae Bonaparte, 1831		
475	<i>Cladorhynchus</i> G.R. Gray, 1840	Австралійський кулик-довгоніг	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Himantopus</i> (див. № 476 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Cladorhynchus leucoccephalus</i>
476	<i>Himantopus</i> Brisson, 1760	Кулик-довгоніг	[20]
477	<i>Recurvirostra</i> Linnaeus, 1758	Чоботар	Другий синонім означення роду у О. П. Маркевича, К. І. Татарка [11]
478	Burhinidae Mathews, 1912		
479	<i>Burhinus</i> Illiger, 1811	Лежень	[4]
480	<i>Esacus</i> Lesson, 1831	Рифовий лежень	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Burhinus</i> (див. № 479 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Esacus magnirostris</i>
481	Glareolidae C.L. Brehm, 1831		
482	Cursoriinae G.R. Gray, 1840		
483	<i>Cursorius</i> Latham, 1790	Бігунець	[11]
484	<i>Pluvianus</i> Vieillot, 1816	Єгипетський бігунець	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Cursorius</i> (див. № 483 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Pluvianus aegyptius</i>
485	<i>Rhinoptilus</i> Strickland, 1852	Короткодзьобий бігунець	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Cursorius</i> (див. № 483 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за прикметою усіх видів роду
486	<i>Smutsornis</i> Roberts, 1922	Смугастоволий бігунець	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Cursorius</i> (див. № 483 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Smutsornis africanus</i>
487	Glareolinae C.L. Brehm, 1831		
488	<i>Glareola</i> Brisson, 1760	Дерихвіст	[4]
489	<i>Stiltia</i> G.R. Gray, 1855	Австралійський дерихвіст	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Glareola</i> (див. № 488 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Stiltia isabella</i>
490	Charadriidae Leach, 1820		
491	Vanellinae Bonaparte, 1842		

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
492	<i>Erythrogonyx</i> Gould, 1838	Чорногруда чайка	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Vanellus</i> (див. № 493 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Erythrogonyx cinctus</i>
493	<i>Vanellus</i> Brisson, 1760	Чайка	[4]
494	Charadriinae Leach, 1820		
495	<i>Anarhynchus</i> Quoy et Gaimard, 1830	Криводзьобий пісочник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Charadrius</i> (див. № 496 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Anarhynchus frontalis</i>
496	<i>Charadrius</i> Linnaeus, 1758	Пісочник	Перший синонім означення роду у О. П. Маркевича, К. І. Татарка [11]
497	<i>Elseyornis</i> Mathews, 1914	Чорнолобий пісочник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Charadrius</i> (див. № 496 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Elseyornis melanops</i>
498	<i>Oreopholus</i> Jardine et Selby, 1835	Тонкодзьобий хрустан	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Charadrius</i> (див. № 496 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують назву «хрустан»; прикметник, як в укр. назві виду <i>Oreopholus ruficollis</i>
499	<i>Peltohyas</i> Sharpe, 1896	Австралійський пісочник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Charadrius</i> (див. № 496 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Peltohyas australis</i>
500	<i>Phegornis</i> G.R. Gray, 1846	Андійський пісочник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Charadrius</i> (див. № 496 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Phegornis mitchellii</i>
501	<i>Pluvialis</i> Brisson, 1760	Сивка	[11]
502	Pluvianellinae Jehl, 1975		
503	<i>Pluvianellus</i> G.R. Gray, 1846	Послотюх	Введено у цій праці; синонім назви «сивка звичайна» [23], рід таксономічно відносно близький до роду Сивка (<i>Pluvialis</i>)
504	Scolopacidae Rafinesque, 1815		
505	Scolopacinae Rafinesque, 1815		
506	<i>Scolopax</i> Linnaeus, 1758	Слуква	[8]
507	Gallinaginae Olphe-Galliard, 1891		
508	<i>Coenocorypha</i> G.R. Gray, 1855	Острівний баранець	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Gallinago</i> (див. № 509 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, за розташуванням ареалів усіх видів роду
509	<i>Gallinago</i> Brisson, 1760	Баранець	[20]
510	<i>Limnodromus</i> Wied, 1833	Неголь	Введено у цій праці; синонім назви «грицик великий» [23], рід таксономічно відносно близький до роду Грицик (<i>Limosa</i>)
511	<i>Lymnocyrtus</i> Boie, 1826	Малий баранець	[20]
512	Tringinae Rafinesque, 1815		
513	<i>Actitis</i> Illiger, 1811	Набережник	[20]
514	<i>Bartramia</i> Lesson, 1831	Короткодзьобий кульон	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Numenius</i> (див. № 518 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Bartramia longicauda</i>
515	<i>Catoptrophorus</i> Bonaparte, 1827	Американський коловодник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Tringa</i> (див. № 520 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Catoptrophorus semipalmatus</i>
516	<i>Heteroscelus</i> Baird, 1858	Попелястий коловодник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Tringa</i> (див. № 520 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Heteroscelus brevipes</i>
517	<i>Limosa</i> Brisson, 1760	Грицик	[20]
518	<i>Numenius</i> Brisson, 1760	Кульон	[20]
519	<i>Prosobonia</i> Bonaparte, 1850	Куліга	Введено у цій праці; синонім назви «коловодник» [23], цей рід таксономічн близький до роду Коловодник (<i>Tringa</i>)
520	<i>Tringa</i> Linnaeus, 1758	Коловодник	[23]
521	<i>Xenus</i> Kaup, 1829	Мородунка	[10]
522	Arenariinae Stejneger, 1885		
523	<i>Arenaria</i> Brisson, 1760	Крем'яшник	[4]
524	Calidrinae Reichenbach, 1849		

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
525	<i>Aphriza</i> Audubon, 1839	Американський побережник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Calidris</i> (див. № 526 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Aphriza virgata</i>
526	<i>Calidris</i> Merrem, 1804	Побережник	[4]
527	<i>Eurynorhynchus</i> Nilsson, 1821	Лопатень	[20]
528	<i>Limicola</i> Koch, 1816	Болотяний побережник	[20]
529	<i>Micropalama</i> Baird, 1858	Довгоногий побережник	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Calidris</i> (див. № 526 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Micropalama himantopus</i>
530	<i>Philomachus</i> Merrem, 1804	Брижач	[20]
531	<i>Tryngites</i> Cabanis, 1817	Жовтоволик	[20]
532	Phalaropodinae Bonaparte, 1831		
533	<i>Phalaropus</i> Brisson, 1760	Плавунець	[4]
534	<i>Steganopus</i> Vieillot, 1819	Довгодзьобий плавунець	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Phalaropus</i> (див. № 533 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Steganopus tricolor</i>
535	Pedionomidae Bonaparte, 1856		
536	<i>Pedionomus</i> Gould, 1841	Ерант	Введено у цій праці; запозичено з французької — “errant”, за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флінта [1], використано для єдиного виду роду
537	Thinocoridae Sundevall, 1826		
538	<i>Attagis</i> I. Geoffroy Saint-Hilaire et Lesson, 1831	Атагіс	Транскрипція з лат. назви роду, вжита у цій праці
539	<i>Thinocorus</i> Eschscholtz, 1829	Тинокор	Введено у цій праці; транскрипція з лат. назви роду без кінцевої морфемі -us
540	Chionidae Lesson, 1828		
541	<i>Chionis</i> J.R. Forster, 1788	Сніжниця	Введено у цій праці; використано через біле оперення птахів та їхнє поширення на узбережжі Антарктиди
542	Stercorariidae G.R. Gray, 1870		
543	<i>Catharacta</i> Brünnich, 1764	Великий поморник	[11]
544	<i>Stercorarius</i> Brisson, 1760	Поморник	[4]
545	Laridae Rafinesque, 1815		
546	<i>Creagrus</i> Bonaparte, 1854	Галапагоський мартин	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Larus</i> (див. № 547 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Creagrus furcatus</i>
547	<i>Larus</i> Linnaeus, 1758	Мартин	[4]
548	<i>Leucophaeus</i> Bruch, 1853	Магеланський мартин	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Larus</i> (див. № 547 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Leucophaeus scoresbii</i>
549	<i>Pagophila</i> Kaup, 1829	Білий мартин	[11]
550	<i>Rhodostethia</i> MacGillivray, 1842	Рожевий мартин	[11]
551	<i>Rissa</i> Stephens, 1826	Трипалій мартин	[4]
552	<i>Xema</i> Leach, 1819	Вилохвостий мартин	[11]
553	Sternidae Vigors, 1825		
554	<i>Anous</i> Stephens, 1826	Бурий крячок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Sterna</i> (див. № 562 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Anous stolidus</i>
555	<i>Chlidonias</i> Rafinesque, 1822	Болотяний крячок	[4]
556	<i>Gelochelidon</i> C.L. Brehm, 1830	Чорнодзьобий крячок	[4]
557	<i>Gygis</i> Wagler, 1832	Білий крячок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Sterna</i> (див. № 562 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Gygis alba</i>
558	<i>Hydroprogne</i> Kaup, 1829	Каспійський крячок	[20]

№	Латинська назва (ряд, родина, підродина, рід)	Українська назва роду	Джерело пропозиції української назви роду
559	<i>Larosterna</i> Blyth, 1852	Крячок-інка	Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з родом <i>Sterna</i> (див. № 562 у цій табл.); прикладка — видове означення у лат. назві єдиного виду <i>Larosterna inca</i>
560	<i>Phaetusa</i> Wagler, 1832	Великодзьобий крячок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Sterna</i> (див. № 562 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Phaetusa simplex</i>
561	<i>Procelsterna</i> Lafresnaye, 1842	Сірий крячок	Введено у цій праці; споріднений з родом <i>Sterna</i> (див. № 562 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Procelsterna cerulea</i>
562	<i>Sterna</i> Linnaeus, 1758	Крячок	[4]
563	<i>Thalasseus</i> Boie, 1822	Рябодзьобий крячок	[10]
564	<i>Rhynchopidae</i> Bonaparte, 1838		
565	<i>Rhynchops</i> Linnaeus, 1758	Водоріз	[11]
566	<i>Alcidae</i> Leach, 1820		
567	<i>Aethia</i> Merrem, 1788	Конюга	[11]
568	<i>Alca</i> Linnaeus, 1758	Гагарка	[11]
569	<i>Alle</i> Link, 1806	Люрик	[20]
570	<i>Brachyramphus</i> M. Brandt, 1837	Пижик	[11]
571	<i>Cepphus</i> Pallas, 1769	Чистун	[11]
572	<i>Cerorhinca</i> Bonaparte, 1828	Дзьоборіг	Введено у цій праці; неологізм, утворений за характерною ознакою птахів виду <i>Cerorhinca monocerata</i> , єдиного у роді
573	<i>Cyclorhynchus</i> Kaup, 1829	Білочеревець	Введено у цій праці; переклад з рос. назви «белобрюшка» [1]
574	<i>Fratercula</i> Brisson, 1760	Іпатка	Введено у цій праці; використано одну з рос. назв виду <i>Fratercula corniculata</i> [1]
575	<i>Ptychoramphus</i> M. Brandt, 1837	Алеутський пижик	Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом <i>Brachyramphus</i> (див. № 570 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду <i>Ptychoramphus aleuticus</i>
576	<i>Synthliboramphus</i> M. Brandt, 1837	Моржик	Введено у цій праці; прототипом стала пол. назва — «morzyk» [30]
577	<i>Uria</i> Brisson, 1760	Кайра	[11]

Більшість іменникових назв родів подано як однослівні, проте трапляються й іншого типу — двокомпонентні, прикладкові іменники, тобто такі, що утворені означеним словом-основою та прикладкою до нього, які пишуть через дефіс. Стосовно іменникових назв зауважимо, що в разі, коли рід представлений лише одним видом і назва виду є індивідуалізованою — не повторюється в назві жодного іншого виду птахів, тоді фонетично назви роду і виду є однаковими, наприклад рід Жовтоволик — *Tryngites* і вид жовтоволик — *Tryngites subruficollis* (Scolopacidae, Charadriiformes).

Використання одного з двох варіантів назв у формі поєднання прикметника та іменника подібне до застосування іменникової індивідуалізованої назви виду: обидві складові такої родової назви повторюються у назві одного з видів, які належать до відповідного роду. Такий взаємовплив вітчизняних назв виду і роду широко усталився у науковому використанні. Своєрідність іншого варіанту цієї форми назв роду в тому, що функціонально вона є узагальнювальною, бо прикметник такої назви відображає загальну рису усіх видів роду і не повторюється з тим самим іменником в жодній з назв видів, до якого б роду вони не належали. Приклад такої назви містить визначник М. А. Воїнственського та О. Б. Кістяківського [4]: рід Болотняний крячок — *Chlidonias* (Sternidae, Charadriiformes).

Обидві форми національних назв родів вітчизняної фауни та їх варіанти представлені у щойно згаданому визначнику. Усі чотири типи назв наведено також у таблиці, яку вміщено в цьому описі.

У зоологічному словнику О. П. Маркевича та К. І. Татарка [11] для означення родів невітчизняної фауни застосовано певні неологізми, зокрема «коронач» стосовно роду *Goura* (Columbidae, Columbiformes). Зазначене нововведення співзвучне зі словацькою назвою

“korunáč” [29], якою позначають той самий рід. За цим зразком для формування національної номенклатури птахів світу застосовано неологізми і зроблено запозичення з низки іноземних мов, що відображено у наведеній таблиці. Належність слів до неологізмів встановлено через порівняння з лексикою, що містять видання «Великий тлумачний словник сучасної української мови» [2] та «Український орфографічний словник» [15].

Варто зауважити, що українська номенклатура птахів як вітчизняної фауни, так і раніше поіменованої частини фауни світу містить незначну кількість назв, транскрибованих з латини [4, 5, 10, 11, 19, 20, 23]. Таку саму тенденцію можна побачити і в інших мовах, наприклад англійській. Зумовлена ця обставина, ймовірно, тим, що птахи є об’єктом спостережень людини з давніх часів, і наслідком цього стало виникнення розмаїття автентичних аборигенних назв птахів, які доволі активно залучають з однієї мови в іншу.

Лише в одному випадку у пропонованому переліку національних назв застосовано цілком нову форму означення роду — персоналізовану назву: рід Орел Ісідори — *Oroaetus* (Accipitridae, Falconiformes), вона повністю повторює вітчизняну назву виду *Oroaetus isidori*, який є єдиним у цьому роді.

У переважній більшості зведень, що стосуються вітчизняної фауни, у назвах видів, які складаються з прикметника та іменника, першим стоїть іменник [3, 5, 7, 14, 24]. Таку послідовність складових назви виду прийнято і у спеціальних працях з номенклатури [11, 18, 19, 20, 23]. Тож щоб і на письмі, і у вимові легко було відрізнити подібні назви роду та виду, для означення роду обрано форму, в якій прикметник стоїть першим. Зокрема, таке розміщення частин родової назви властиве кільком працям [4, 8, 10, 11, 19, 20]. У більшості з них назви родів подано з великої початкової літери за зразком латинської номенклатури, бо кожна така назва позначає лише певний таксон, подібно до власного імені. Водночас національні назви видів, на відміну від латинських видових означень, прийнято писати з малої літери, тому що їх використовують також як синоніми загального поняття «особина».

Представлена таблиця в опосередкованому вигляді містить пропоновані вітчизняні назви для понад 170 видів птахів, стосовно яких українських означень досі не було: у формі поєднання прикметника та іменника ці назви використано для утворення назв відповідних родів. Прикметникові означення обрано на основі даних з поширення, особливостей біології, поведінки і зовнішнього вигляду птахів, що вміщені у зведенні “Handbook of the Birds of the World” [26, 27, 28].

До таблиці включено латинські назви цих видів. Присвоєння національних назв кожному виду птахів світової фауни створює можливість за певним порядком надалі пропонувати назви родів, переліки яких у різних класифікаційних системах частково відмінні.

Література

1. Бёме Р. Л., Флинт В. Е. Пятиязычный словарь названий животных. Птицы. Латинско-русский-английский-немецкий-французский. — М., 1994. — 845 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. — 1440 с.
3. Воїнственський М. А. Птахи. — К., 1984. — 300 с.
4. Воїнственський М. А., Кістяківський О. Б. Визначник птахів УРСР. — 1-е вид. — К., 1952. — 352 с.
5. Воїнственський М. А., Кістяківський О. Б. Визначник птахів УРСР. — 2-е вид. — К., 1962. — 372 с.
6. Загороднюк І. В. Роди звірів східноєвропейської фауни та їх українські назви // Вісник Національного науково-природничого музею НАН України. — 2001. — Вип. 1. — С. 113–132.
7. Зубаровський В. М. Хижі птахи. — Київ : Наук. думка, 1977. — 330 с. — (Фауна України. Птахи; Том 5. Вип. 2).
8. Кістяківський О. Б. Курині. Голуби. Рябки. Пастушки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини. — К. : Вид-во АН УРСР, 1957. — 432 с. — (Фауна України. Птахи; Том 4).
9. Кістяківський О. Б., Корнєєв О. П. Посібник з зоогеографії. — 2-е вид. — К., 1968. — 132 с. + 50 іл. табл.

10. Марисова І. В., Талпош В. С. Птахи України. — К. : Вища школа, 1984. — 184 с.
11. Маркевич О. П., Татарко К. І. Російсько-українсько-латинський зоологічний словник : Термінологія і номенклатура. — К. : Наук. думка, 1983. — 410 с.
12. Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Видання четверте. Ухвалений Міжнародним союзом біологічних наук : Пер. з англ. і фр. — К., 2003. — XLIII+175 с.
13. Решетило Остап. Зоогеографія : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. — 232 с.
14. Смогоржевський Л. О. Гагари. Норці. Трубноносі. Веслоногі. Голінасті. Фламініго. — К. : Наук. думка, 1979. — 187 с. — (Фауна України. Птахи; Том 5. Вип. 1).
15. Український орфографічний словник. — К. : Довіра, 2002. — 1006 с.
16. Фесенко Г. Форми українських назв родового рівня в класифікації птахів фауни України // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. — 2007. — Вип. 43. — С. 3–12.
17. Фесенко Г. В. Формування складу назв родів і видів птахів світу в українській лексиці // Наукові записки Державного природознавчого музею. — 2013. — Вип. 29. — С. 203–213.
18. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анований список українських наукових назв птахів фауни України. — [1-е вид.]. — Київ, Львів, 2000. — 44 с.
19. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анований список українських наукових назв птахів фауни України. — 2-е вид., виправл. і доповн. — Київ; Львів, 2002. — 44 с.
20. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). — 3-е вид. — Київ; Львів, 2007. — 112 с.
21. Фесенко Г. В., Шидловський І. В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 1. Нотогейська і Неогейська суші // Біологічні студії. — 2012. — Том 6 (3). — С. 197–222.
22. Фесенко Г. В., Шидловський І. В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 2. Палеогейська і Арктогейська суші // Біологічні студії. — 2013. — Том 7 (1). — С. 205–226.
23. Шарлемань М. Словник зоологічної номенклатури. Назви птахів (Проект). — Київ : Держ. вид-во України, 1927. — Ч. 1. — 63 с.
24. Шарлемань М. В. Птахи УРСР. — Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. — 266 с.
25. Dubois A. The genus in zoology: a contribution to the theory of evolutionary systematics. — Paris, 1988. — 124 p. — (Mem. Mus. natl. Nat. hist. Ser. A (Zoologie), Tome 140).
26. Handbook of the Birds of the World. Ostrich to Ducks / Eds J. del Hoyo, A. Elliott & J. Sartagal. — Barcelona : Lynx Edicions, 1992. — Vol. 1. — 696 p.
27. Handbook of the Birds of the World. New World Vultures to Guineafowl / Eds J. del Hoyo, A. Elliott & J. Sartagal. — Barcelona : Lynx Edicions, 1994. — Vol. 2. — 638 p.
28. Handbook of the Birds of the World. Hoatzin to Auks / Eds J. del Hoyo, A. Elliott & J. Sartagal. — Barcelona : Lynx Edicions, 1996. — Vol. 3. — 752 p.
29. Kovalik P., Pačėnovský S., Čapek M., Topercer J. Slovenské mená vtákov sveta. — Bratislava, 2010. — 396 s.
30. Mielczarek P., Cichocki W. Polskie nazewnictwo ptaków świata // Notatki ornitologiczne. — 1999. — T. 40, Z. Sp. — 264 s.

Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 1. — Фесенко Г. В. — Обґрунтовано потребу формування складу національних назв родів птахів світової фауни як основи для створення за принципом типіфікації системи вітчизняної номенклатури таксонів надродового рівня. Наразі усталеними у вітчизняному називництві птахів є чотири типи назв родів, які застосовано у пропонованому переліку. У працях попередників національними назвами означено менше 200 родів невітчизняної фауни, що є незначною часткою в класифікаціях птахів світу. У пропонованому переліку наведено 460 родів, з яких майже для двох третин національні назви обрано вперше. Склад родів відповідає класифікаційній системі, прийнятій у виданні “Handbook of the Birds of the World”. Перелік охоплює лише частину рядів негоробиних птахів, а саме Struthioniformes, Tinamiformes, Sphenisciformes, Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Opisthocomiformes, Gruiformes, Charadriiformes. В якості національних означень родів вжито низку неологізмів і зроблено запозичення з кількох іноземних мов. В опосередкованій формі представлено національні назви для понад 170 видів птахів, які дотепер не були означені у вітчизняних наукових джерелах.

Ключові слова: українська номенклатура птахів, назви родів, орнітофауна світу.

Адреса: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б. Хмельницького, 15, Київ, 01601 Україна; e-mail: h.fesenko@gmail.com

Названия родов в отечественном именовании птиц мира. Неворобьиные. Часть 1. — Фэсэнко Г. В. — Обоснована необходимость формирования состава национальных названий родов птиц мира как основы для создания по принципу типификации отечественной номенклатуры надродового уровня. На сегодня в отечественной номенклатуре устоялись четыре типа названий родов, использованные в предложенном перечне. В статье представлено 460 родов, из которых почти для двух третей национальные названия указаны впервые. Состав родов соответствует классификации, принятой в “Handbook of the Birds of the World”. Перечень охватывает часть отрядов неворобьиных птиц, а именно Struthioniformes, Tinamiformes, Sphenisciformes, Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Opisthocomiformes, Gruiformes, Charadriiformes. В качестве названий родов использовано ряд неологизмов и заимствований из нескольких иностранных языков. В опосредованной форме впервые представлены национальные названия для более чем 170 видов птиц.

Ключевые слова: украинская номенклатура птиц, названия родов, орнитофауна мира.

Адрес: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б. Хмельницького, 15, Київ, 01601 Україна; e-mail: h.fesenko@gmail.com